

Gli ultimi 10 giorni, sono stati caratterizzati da piogge, se pur di breve entità, che hanno contribuito ad avere una umidità dell'aria sempre alta, le temperature medie sono andate in aumento.

La situazione fitosanitaria generale è in peggioramento sui vigneti già colpiti da peronospora dove più cicli di infezione si susseguono e/o accavallano sulla vegetazione interessando, nei casi più gravi, il grappolo o addirittura l'intero germoglio. **PRESENZA DELLA FORMA LARVATA.** Pochi ed isolati FOCOLAI DI OIDIO.

Diversamente, nei vigneti (opportunamente trattati e con prevenzione eseguita in modo precoce dal mese di aprile), dove è stato possibile contenere la virulenza iniziale, del fungo, la situazione rimane sotto controllo con vecchi attacchi peronosporici confinati alle foglie basali o al massimo si intravede qualche grappolo interessato recentemente dalla patologia.

STADIO FENOLOGICO:

VITIGNI	COLLINA	VALLATA
PRECOCI	CHIUSURA GRAPPOLO	PRE- CHIUSURA GRAPPOLO
TARDIVE	PRE-CHIUSURA GRAPPOLO	ACCRESIMENTO ACINI

CONTROLLO DELLE PRINCIPALI FITO e FISIOPATIE

Continuare la terapia di protezione del grappolo con sostanze che si legano alle cere e continuare a proteggere la vegetazione fotosinteticamente attiva:

➤ PERONOSPORA

Nei vigneti mediamente colpiti da peronospora, OPTARE PER UNA DELLE SEGUENTI STRATEGIE:

Strategia	Sostanza attiva	note
1	CIAZOFAMIDE	**In associazione a prodotti di copertura. Max 2 trattamenti.
2	AMETOCTRADINA	In associazione a prodotti di copertura o FOSFONATI MAX 3 Tratt
3	COMPOSTI RAMEICI	BIO

➤ OIDIO:

si consiglia di intervenire con ZOLFO rafforzando la difesa come da seguente prospetto:

Strategia	Sostanza attiva	note	Nota2
1	METRAFENONE	Max 3 Trattamenti in alternativa tra loro	
2	PROQUINAZID	Max 2 Trattamenti in alternativa tra loro	
3	Olio essenziale di arancio dolce	BIO	Utile anche come ANTIPERONOSPORICO con fungo in fase di SPORULAZIONE.

PRATICHE AGRONOMICHE CONSIGLIATE: si consiglia di **OPPORTUNA GESTIONE DELLA CHIOMA (SFOGLIATURA)** con l'obiettivo di liberare il grappolo dalle foglie permettendo una migliore aerazione ed opportuna copertura anticrittogamica, **EVITANDO DI SCOPRIRE IL GRAPPOLO ALLA LUCE DIRETTA DEL SOLE SOPRATTUTTO NELLE ESPOSIZIONI PIU' ASSOLATE.** Di regola per contenere i rischi da scottature, la defogliazione precoce va effettuata solo sul lato del filare meno esposto al sole, ovvero sul lato verso Est oppure verso Nord.

OLIVO

È IN CORSO IL MONITORAGGIO DELLA MOSCA OLEARIA, SARETE PRONTAMENTE AVVISATI IN MERITO AL TRATTAMENTO DA ESEGUIRE

Per una corretta strategia di difesa e ulteriori informazioni potete contattarmi in cantina nei giorni di martedì e giovedì dalle 09:00 alle 12:00.

IL TECNICO
Dott. Nicola DI CIANO