



CANTINA SAN ZEFFERINO  
Società Cooperativa Agricola




COMITATO TECNICO ESPERTI VITIVINICOLI

# NOTIZIARIO DI VITICOLTURA

10 maggio 2022

N° 3

## Andamento Climatico:



Le piogge cadute nel fine settimana, tra i giorni 06 / 08 Maggio, (10-12 mm), unitamente al relativo andamento termico (temperatura media di 15 °C), stabiliscono le condizioni utili all'innescò delle infezioni Primarie di PERONOSPORA.

Si precisa che alla data odierna la maggior parte dei vitigni, in tutti gli aerali – di vallata e collina, presenta un adeguato sviluppo vegetativo, con tutti gli organi potenzialmente recettivi alle patologie fungine.

Da segnalare anche un favorevole andamento climatico per lo sviluppo dell'Oidio.

## Fase Fenologica:

Si evidenzia una diversità di sviluppo fenologico tra le varietà, in relazione all'ubicazione dei vigneti.

Le "Precoci", nelle zone meglio esposte, si trovano nella fase di Grappoli Separati, in forte spinta vegetativa; le "Tradizionali" (soprattutto Trebbiano ) in particolar modo, nelle zone più fredde, si presentano con germogli a 3-4 foglie distese e un'infiorescenza appena visibile.

## Controllo e prevenzione principali FITOPATIE:

A fronte delle suddette analisi, si consiglia di distinguere il controllo delle avversità fungine in funzione soprattutto dello sviluppo vegetativo, scegliendo Prodotti Sistemici sui vitigni precoci. Questi ultimi infatti, in previsione di un innalzamento termico previsto nei prossimi giorni, potrebbero intensificare il ritmo di crescita vegetativa, ed arrivare nel giro di una decina di giorni in fase di Pre-Fioritura.

Si consiglia di intervenire come segue:

## ➤ PERONOSPORA:

**Vitigni Tradizionali** e/o vitigni con sviluppo Vegetativo inferiore ai 30 cm:

vitigni	Strategia	Sostanza attiva	note
Tardivi	1	Metiram	<b>Metiram (Max 3 Trattamenti) – tra Dithianon e Folpet sono consentiti al massimo 4 interventi anno di cui massimo 3 di folpet, 3 di dithianon,</b>
	2	Dithianon	
	3	Folpet	
Precoci/ Tardivi	4	Sali di Rame	bio

Strategia	Sostanza attiva	note
AGGIUNTA	Mandipropammide – Dimetomorf – Iprovalicarb - Benthiavalicarb	Max 4 Trattamenti in alternativa ad altri CAA

**Vitigni Precoci** e/o vitigni con sviluppo vegetativo superiore ai 30 cm:

vitigni	Strategia	Sostanza attiva	note
Precoci	5	Fluopicolite + Fosetil Al	Max 2 trattamenti
	6	Metalaxil m o Benalaxil m + Sostanze Attive di copertura	Max 3 trattamenti
	7	Oxathiopiprolin+ Folpet	Max 2 trattamenti

## ➤ OIDIO

**SOSTANZE ATTIVE di COPERTURA come specificato in tabella sottostante:**

Strategia	Sostanza attiva	note
1	Zolfo bagnabile	bio

**Sui Vitigni Precoci e/o vitigni con sviluppo vegetativo superiore ai 30 cm, e nei vigneti particolarmente sensibili**

Strategia	Sostanza attiva	note
AGGIUNTA	Spiroxamina	Max 3 trattamenti
AGGIUNTA	Triazoli	Max 3 trattamenti

***Per una corretta strategia di difesa e ulteriori informazioni potete contattarmi in cantina nei giorni di martedì e giovedì dalle 09:00 alle 12:00.***

IL TECNICO  
Dott. Nicola DI CIANO