



CANTINA SAN ZEFFERINO
Società Cooperativa Agricola




COMITATO TECNICO ESPERTI VITIVINICOLI

NOTIZIARIO DI VITICOLTURA

4 Maggio 2023

N° 3



Analisi e Controllo delle principali FITO e FISIOPATIE: Diverse ore di Bagnatura fogliare e pioggia battente soprattutto nella giornata di LUNEDÌ 1° MAGGIO hanno alzato il livello di RISCHIO DELLE MALATTIE FUNGINE. La presenza di macchie d’olio – in alcuni casi già coperte da muffa biancastra – testimonia avvio di INFEZIONI PRIMARIE DI PERONOSPORA. Continuano a presentarsi manifestazioni di Botrite su alcuni vigneti – in modo particolare su varietà precoci (PINOT G. e CHARDONNAY) ma non si ritiene opportuno il controllo fitosanitario diretto con prodotti specifici, bensì si consiglia di scegliere principi attivi Antiperonosporici che hanno attività secondaria di controllo della botrite – come il Folpet.

Stadio fenologico:

Andamento climatico, in modo particolare le temperature relativamente basse, ha in parte rallentato il ritmo di crescita della vite. Si distinguono importanti differenze vegetative come di seguito riportato:

VITIGNI	COLLINA	FONDOVALLE
PRECOCI	BOTTONI FIORALI SEPARATI	4°- 5° FOGLIA DISTESA CON GRAPPOLI SEPARATI.
TARDIVE	3°- 4° FOGLIA DISTESA CON GRAPPOLI VISIBILI	2° - 3° FOGLIA DISTESA

Si consiglia di intervenire – Su Tutti I VIGNETI – ENTRO IL FINE SETTIMANA come da seguente prospetto:

➤ PERONOSPORA

Nei vigneti tradizionali, con germogli al disotto dei 20 cm di sviluppo, si consiglia di utilizzare SOSTANZE ATTIVE di COPERTURA utilizzando – in alternativa tra loro, uno dei principi seguenti principi attivi: METIRAM – DITHIANON – FOLPET – RAME (biologico):

ASSOCIANDO uno dei seguenti principi attivi:

Strategia	Sostanza attiva	note
1	Bentiavalicarb	Max 4 trattamenti in alternativa tra di LORO. Bentiavalicarb Max 2 trattamenti
2	Dimetomorf	
3	Mandipropammide	
4	Laminarina	BIO – utile anche nel controllo dell'oidio
5	Cerevisane	BIO – utile anche nel controllo dell'oidio

Nei vigneti con vegetazione particolarmente sviluppata – superiore ai 35-40 cm (BOTTONI FIORALI SEPARATI)- si consiglia di intervenire diversamente optando per una delle seguenti strategie:

Strategia	Sostanza attiva	note
1	Flupicolide + fosetilal	Max 2 trattamenti
2	Benalaxil-m	In associazione a prodotti di copertura. Max 3 trattamenti in alternativa tra loro
3	Metalaxil-m	
4	Oxathiopiprolin	In associazione a prodotti di copertura. Max 2 trattamenti.

➤ **OIDIO:**

si consiglia di intervenire con zolfo rafforzando la difesa come da seguente prospetto:

Strategia	Sostanza attiva	note	Nota2
1	Spiroxamina	Max 3 trattamenti	vigneti tradizionali meno sviluppati
		note	
2	Triazoli (PENCONAZOLO- TETRACONAZOLO)	Max 3 Trattamenti in alternativa tra loro	vigneti precoci piu' sviluppati

Per una corretta strategia di difesa e ulteriori informazioni potete contattarmi in cantina nei giorni di martedì e giovedì dalle 09:00 alle 12:00.

**IL TECNICO
Dott. Nicola DI CIANO**