



NOTIZIARIO DI VITICOLTURA

10 giugno 2022

N° 5

24 maggio – 10 giugno

PRECIPITAZIONI tra il 24 maggio e l'8 giugno, praticamente assenti, nei giorni 9 e 10 giugno sono caduti circa 70 mm di pioggia nelle differenti aree monitorate. Per quanto riguarda l'UMIDITA' si ricorda come le particolari condizioni climatiche, degli ultimi 15 giorni, hanno generato bagnatura fogliare nelle prime ore del mattino, anche in aree diverse da quelle vallive.

TEMPERATURA dell'ARIA (giornaliera): medie di poco superiori ai 20 °C e **MASSIME** che hanno superato i 30°C per diversi giorni con picco di 40°C registrato nel giorno 05 giugno 2022, con brusco abbassamento a 16-18 °C tra il 9 e 10 giugno

Stadio Vegetativo: elevato ritmo di crescita vegetativa dei germogli, con infittimento della chioma ed affastellamento fogliare della zona grappolo con fasi fenologiche differenti come di seguito riportato:

Vigneti	ZONE Vallive	ZONE Collinari
Precoci/medio Precoci (CHARDONNAY- PINOT G – PECORINO-MOSCATO SANGIOVESE – MERLOT)	Acino di Pepe	Accrescimento Acino
Tradizionali (MONTEPULCIANO D'AB. – TREBBIANI – PASSERINA- COCCIOLO)	60-80 % di Calipre Cadute	Acino di Pepe

SEGNALAZIONI FITOSANITARIE: Altissimo RISCHIO di INFEZIONI di OIDIO.

Leggera presenza di "Peronospora su grappolo" riscontrata nelle zone umide e dove i primi trattamenti sono stati posizionati in ritardo e/o non è stato rispettato il turno di ripetizione trattamenti. Segnalata presenza di GALLE di FILLOSSERA su alcune VARIETA' (CHARDONNAY e PECORINO). Presenza di Tripidi su alcuni aerali e vitigni (MONTEPULCIANO).

Controllo e prevenzione principali FITOPATIE: considerando gli ultimi eventi piovosi, mantenere alto il livello di copertura fitosanitaria optando per una delle seguenti strategie.

Si consiglia di intervenire tempestivamente come segue:

➤ PERONOSPORA

SOSTANZE ATTIVE di COPERTURA Associate ad uno dei principi attivi specificati nella tabella sottostante,

Strategia	Sostanze attiva	Note
1	Metalaxil-M	Max 3 trattamenti
2	Oxathiapiprolin	Max 2 trattamenti
3	Ciazofamide	Utilizzabile per un massimo di 3 volte l'anno in alternativa tra loro
4	Amisulbron	
5	Zoxamide	Max 4 trattamenti
6	Ametoctradina	Max 3 trattamenti

➤ **OIDIO**, MASSIMA ALLERTA. Applicare ZOLFO con massimo dosaggio di etichetta, associato ad uno dei principi attivi sotto riportati:

Strategia	Sostanza attiva	note
1	CIFLUFENAMMIDE	Max 2 trattamenti
2	METRAFENONE	Max 2 trattamenti
3	PROQUINAZID	Max 2 trattamenti
4	BOSCALID	Max 2 trattamenti – utili anche

- **BOTRITE**, Sui vitigni sensibili, valutare applicazione di antibotritico prima della chiusura grappolo. Si ricorda attività parallela di alcuni antioidici (BOSCALID) e antiperonoporici (ZOXAMIDE) nel controllo di questa patologia. Valutare opportuna strategia di controllo con il proprio tecnico agronomico.
- **TIGNOLETTA II GENERAZIONE** : in corso il monitoraggio degli adulti, al momento non si registrano catture; le piogge previste nei prossimi giorni potrebbero innescare inizio volo. Seguiranno informazioni ed indicazioni specifiche di controllo nei prossimi bollettini.
- **Nota Tecnica Agronomica**: si consiglia di eseguire nel più breve tempo possibile la POTATURA VERDE con l'obiettivo di liberare il grappolo dalle foglie permettendo una migliore aerazione ed opportuna copertura anticrittogamica.

Per una corretta strategia di difesa e ulteriori informazioni potete contattarmi in cantina nei giorni di martedì e giovedì dalle 09:00 alle 12:00.

IL TECNICO
Dott. Nicola DI CIANO